Я Ахметвалеев Ришат Рафаильевич уже много лет доказываю свой иммунитет. Теперь мой иммунитет доказан при помощи интернете. Таким образом, активность иммунной системы зависит от целого ряда факторов: Здоровье желудочно-кишечного тракта (далее ЖКТ). Ем 5 раз в день.За 2 года поправился всего на 500 грамм Токсическая нагрузка на организм. Живу В Альметьевск нефтяной столице Татарстана. Из за большого количества транспорта и наш город находится в окружении гор качество воздуха плохое
Стабильность нервной системы. С детства я не работаю как инвалид 2 группы. Я сплю 8 часов. Спокоен. Дома
живёт кошка, постоянно её глажу
Качество продуктов питания. . Благодаря маме качество продуктов питания отличное. Мама пенсионер по старости по профессии повар.. Я ем молочную кашу каждый день и пью 100% кофе каждый день. Я ем или пью кисломолочные продукты почти каждый день. Ем овощи и фрукты каждый день. Пью чай с лимоном каждый день и лимон выжимаю в чай а сам лимон съедаю.
Спортом я не занимаюсь.Все виды спорта мне противопоказаны по второй болезни Закаляюсь в ледяной воде по 5 раз в день. Результат анализа сделанный в альметьевском спид центре лимфоцитов 55% при норме от 11 до 37%. Результат анализа поликлиники ПАО Татнефть 49%.Во 2 иммунограмме местный иммунолог написал лимфоцитоз в результате активности т- клеток . Типы Т-лимфоцитов лимфоцитов 52%
Т-лимфоцитов Т-лимфоцитов 2835 при норме 600 -2500 абсолютное число.,Т-клеточные рецепторы являются основными поверхностными белковыми комплексами Т-лимфоцитов, ответственными за распознавание процессированных антигенов, связанных с молекулами главного комплекса гистосовместимости (ГКГ, англ. Major Histocompatibility Complex (MHC)) на поверхности антигенпрезентирующих клеток[2]. Т-клеточный рецептор связан с другим полипептидным мембранным комплексом, CD3. В функции комплекса CD3 входит передача сигналов в клетку, а также стабилизация Т-клеточного рецептора на поверхности мембраны. Т-клеточный рецептор может ассоциироваться с другими поверхностными белками, его корецепторами. В зависимости от корецептора и выполняемых функций различают два основных типа Т-клеток.

Т-хелперы
т-хелперы 1808 при норме 450-850
Антигенраспознающий рецепторный комплекс Т-хелперов
Т-хелперы (от англ. helper — помощник) — Т-лимфоциты, главной функцией которых является усиление адаптивного иммунного ответа. Активируют Т-киллеры, В-лимфоциты, моноциты, NK-клетки при прямом контакте, а также гуморально, выделяя цитокины. Основным признаком Т-хелперов служит наличие на поверхности клетки молекулы корецептора CD4. Т-хелперы распознают антигены при взаимодействии их Т-клеточного рецептора с антигеном, связанным с молекулами главного комплекса гистосовместимости II класса (англ. Major Histocompatibility Complex II (MHC-II)).

Т-киллеры т-киллеры 945 при норме 270-540
Основная статья: Цитотоксические Т-лимфоциты
Т-киллеры, цитотоксические Т-лимфоциты, CTL (от англ. killer «убийца») — Т-лимфоциты, главной функцией которых является уничтожение повреждённых клеток

собственного организма. Мишени Т-киллеров — это клетки, поражённые внутриклеточными паразитами (к которым относятся вирусы и некоторые виды бактерий), опухолевые клетки. Т-киллеры являются главным компонентом антивирусного иммунитета. Основным признаком Т-киллеров служит наличие на поверхности клетки молекулы корецептора CD8. Т-киллеры распознают антигены при взаимодействии их Т-клеточного рецептора с антигеном, связанным с молекулами главного комплекса гистосовместимости I класса (англ. Major Histocompatibility Complex I (MHC-I)).

Т-хелперы и Т-киллеры образуют группу эффекторных Т-лимфоцитов, непосредственно ответственных за иммунный ответ. В то же время существует другая группа клеток, регуляторные Т-лимфоциты, функция которых заключается в регулировании активности эффекторных Т-лимфоцитов. Модулируя силу и продолжительность иммунного ответа через регуляцию активности Т-эффекторных клеток, регуляторные Т-клетки поддерживают толерантность к собственным антигенам организма и предотвращают развитие аутоиммунных заболеваний. Существуют несколько механизмов супрессии: прямой, при непосредственном контакте между клетками, и дистантный, осуществляющийся на расстоянии — например, через растворимые цитокины.

Т-ки́ллеры, цитотокси́ческие Т-лимфоци́ты, CTL (англиц. killer «убийца») — вид Т-лимфоцитов, осуществляющий лизис повреждённых клеток собственного организма. Мишени Т-киллеров — это клетки, поражённые внутриклеточными паразитами (к которым относятся вирусы и некоторые виды бактерий), опухолевые клетки. Т-киллеры являются основным компонентом антивирусного иммунитета.Тренированный иммунитет обеспечивает широкий спектр защиты от бактериальных инфекций

Можно сделать лекарство. Нужно лишь выделить иммуноглобулин из моей крови. . .Иммуноглобулин самое сильное оружие против гриппа.Это оружие нашего организма Предлагаю сделать лекарство на основе моего иммунитета. Часть иммуноглобулина искусственно копируется. Надо начать сейчас чтобы не было слишком поздно.

И если у меня токой сильный иммунитет то может и показатели гаммаглобулин тожее высокие. И я смогу вылечить корь.

Инвалид 2 группы с детства по 2 редким внутренним неизлечимым болезням, По первой болезни 38 лет принимаю лекарство 3 раза в день. По второй болезни могу умереть в любой момент.

Тренированный иммунитет обеспечивает широкий спектр защиты от бактериальных инфекций

Элеонора Кьярло, Tytti Heinonen, Charlotte Théroude, Фатима Асгари, Didier Le Roy, Михай Г Нетеа, Thierry Roger

Журнал инфекционных болезней, jiz692, https://doi.org/10.1093/infdis/jiz692
Опубликованный: 31 декабря 2019 года